

## Discussions de cas

### Cas 1: Mélissa

- Adolescente de 12 ans
- Diabétique type 1 depuis l'âge de 7 ans
- Sous pompe à insuline depuis 2 ½ ans.
- Fréquente l'école secondaire depuis septembre 2006

## Cas 1: situation présentée

- Fin septembre:appel téléphonique de la mère à l'infirmière scolaire pour exprimer son inquiétude face au diabète de sa fille à l'école.
- Aucune procédure n'est prise p/r à l'hypoglycémie

## Cas 1: situation présentée

- Ses professeurs ne sont pas au courant de la maladie.
- L'infirmière scolaire informe la mère que Mélissa doit maintenant gérer seule son traitement .
- La mère est très inquiète de la situation et nous demande d'intervenir.

## Cas 2: Samuel

- Enfant de 4 ans
- Diabétique type 1 récent ( 1 mois)
- Retour à la garderie après l'hospitalisation.
- Une sortie ( cueillette de pommes) est prévue peu après.

## Cas 2: situation présentée

- Samuel n'a pu participer à la sortie prévue en PM re: hyperglycémie
- Il est retourné chez-lui en pleurant.
- Appel téléphonique de la mère. Se dit désespérée. Craint que son fils se sente mis à part à cause de sa maladie

## Cas1: Mélissa

- Ses professeurs ne sont pas au courant de la maladie.
- L'infirmière scolaire informe la mère que Mélissa doit maintenant gérer seule son traitement .
- La mère est très inquiète de la situation et nous demande d'intervenir

## Cas 2: Samuel

- Samuel n'a pu participer à la sortie prévue en PM re: hyperglycémie
- Il est retourné chez-lui en pleurant.
- Appel téléphonique de la mère. Se dit désespérée. Craint que son fils se sente mis à part à cause de sa maladie